


## Ръководство за поставяне на инжекции



NL-HPX-0034 April 2024

Gilead Sciences Netherlands B.V.  
Claude Debussylaan 22  
1082 MD Amsterdam

©2024 Gilead Sciences, Inc. All rights reserved. GILEAD, the GILEAD Logo and Creating Possible are trademarks of Gilead Sciences, Inc.

▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение

## Ръководство за инжектиране стъпка по стъпка

Преди да използвате Hercludex трябва първо да прочетете точки 1—6 от тази листовка.




Преди да започнете лечение с това лекарство вкъщи, Вашият лекар или медицинска сестра ще Ви покажат как да пригответе и инжектирате Hercludex. Настоящото ръководство показва как сами да инжектирате лекарството. Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра, ако не сте сигурни относно нещо или имате въпроси, или се нуждаете от повече информация или помощ. Отделете време, за да пригответе внимателно и инжектирате Hercludex.

### Места на инжектиране


### Корем

### Горната част на бедрото

За да се намалят реакциите на мястото на инжектиране, можете да промените мястото на инжектиране на булевиртид редовно. **Не инжектирайте** булевиртид в следните области: коляно, слабини, долната или вътрешната част на седалището, директно в място над кръвоносен съд, около пъпа, ръбцова тъкан, място със синини, бенка, хирургичен белег, място с татуировка или изгаряне или където има реакция на мястото на инжектиране.




**1А**  
Съхранение



**1Б**  
Приготвяне на дозите



**1В**  
Измиване на ръцете




**1Г**  
Почистване на флакона

Флаконите с булевиртид трябва да се съхраняват в оригиналната опаковка в хладилника (2—8°C), за да се предпази булевиртид от светлина.

Следните указания са за разтваряне на единична доза.

Измивайте ръцете си добре със сапун и топла вода и ги подсушете с чиста кърпа. След като ръцете Ви са чисти, **не** докосвайте нищо друго, освен лекарството, консумативите и областта около мястото на инжектиране.

Избършете горната част на флакона с нов тампон, напоен със спирт и я оставете да изсъхне. Ако докоснете гумената горна част след почистване, отново почистете с нов тампон, напоен със спирт.



**2А**  
**Изтегляне на стерилна вода**

Вземете спринцовката. Поставете по-дългата игла върху нея.

**Важно!** Уверете се, че обезопасената игла е поставена плътно, като я натискате леко, докато я завъртате по посока на часовниковата стрелка.


Издърпайте пластмасовата капачка. Отворете стерилната вода за инжекции. Въведете иглата във флакона и внимателно обърнете флакона с вода с горната част надолу. Уверете се, че върхът на иглата е винаги под повърхността на водата, за да се предотврати попадането на въздушни мехурчета в спринцовката.

Бавно издърпайте буталото навън, за да изтеглите 1,0 ml стерилна вода в спринцовката. Внимателно извадете иглата със спринцовката от флакона.



**2Б**  
**Инжектиране на стерилната вода в праха**

Внимателно почукайте флакона с булевиртид, за да разбие праха. Въведете иглата на спринцовката със стерилна вода във флакона с булевиртид под ъгъл. Инжектирайте стерилната вода бавно, така че да се стича по стената на флакона в праха булевиртид.




**2В**  
**Внимателно смесване на булевиртид**

Внимателно почукайте флакона с булевиртид с пръст в продължение на 10 секунди, за да започне разтваряне на праха. След това внимателно направете въртеливи движения с изправен флакон с булевиртид между дланите си, за да се гарантира напълно смесване. Уверете се, че няма прах булевиртид, залепнал по стената на флакона. **Важно!** Не разклащайте флакона булевиртид. Разклащането ще доведе до образуване на пяна и ще отнеме повече време за разтваряне на лекарството.



**2Г**  
**Проверка на**  
**булевиртид**

След като прахът започне да се разтваря, го оставете настрана и той ще се разтвори напълно. След почукване на флакона, разтварянето може да отнеме до 3 минути.




**2Д**  
**Булевиртид е готов за инжектиране**

Когато е смесен напълно, разтворът булевиртид трябва да бъде бистър. **Важно!** Напълно разтвореният булевиртид трябва да бъде бистър и без пяна. Ако разтворът булевиртид изглежда разпенен или жълтеникав, му дайте повече време за разтваряне.


Ако виждате мехурчета, внимателно почукайте флакона, докато изчезнат. Ако виждате частици в разтвора булевиртид, след като е (напълно) разтворен, не използвайте този флакон. Свържете се с Вашия лекар или фармацевта, който Ви го е отпуснал.

Разтвореният булевиртид трябва да се използва незабавно.



**2Е**  
**Почистване на**  
**флакона**


Почистете горната част на флакона с булевиртид отново, като използвате нов напоен със спирт тампон. Оставете мястото да изсъхне.



**3А**  
**Въведете иглата**  
**във флакона**


Вземете спринцовката.

Въведете иглата във флакона с разтворения булевиртид.




**3Б**  
**Изтеглете**  
**булевиртид**

Внимателно обърнете флакона с горната част надолу. Уверете се, че върхът на иглата винаги е под повърхността на разтвора булевиртид, за да се предотврати навлизането на въздушни мехурчета в спринцовката. Бавно издърпайте буталото, за да изтеглите 1,0 ml булевиртид разтвор.




**3В**  
**Завършване на**  
**подготовката**

Внимателно почукайте или потупайте спринцовката и натиснете/издърпайте буталото, за да отстраните допълнителния въздух и мехурчетата. За да сте сигурни, че ще имате краен обем 1,0 ml булевиртид в спринцовката, може да се наложи да издърпате буталото след маркировката 1,0 ml. Внимателно извадете иглата със спринцовката от флакона.



**3Г**  
**Смяна и изхвърляне**  
**на иглата**

Отстранете поддългата игла от спринцовката и я изхвърлете по подходящ начин, така че никой да не може да бъде наранен. **Важно!** Не поставяйте пластмасовата капачка на иглата.



**ЗД**  
**Прикрепване на иглата за инжектиране**

Поставете по-късата игла на спринцовката.

**Важно!** Уверете се, че обезопасената игла е закрепена стабилно, като я натискате леко, докато я завъртате по посока на часовниковата стрелка.

Издърпайте пластмасовата капачка.



**ЗЕ**  
**Избор на място на инжектиране**


Изберете място, различно от това, на което сте поставили последната си инжекция. Почистете мястото на инжектиране с нов тампон, напоен със спирт. Започнете от центъра и като прилагате натиск почистете с кръгово движение в посока навън.

**Важно!** Оставете мястото да изсъхне.



**ЗЖ**  
**Подготовка на мястото на инжектиране**

Захванете и задръжте гънка от кожата около мястото на инжектиране.



**ЗЗ**  
**Инжектиране на булевирид**

Въведете иглата в кожата под ъгъл от 45 градуса. По-голямата част от иглата трябва да бъде въведена в кожата. Бавно натиснете буталото докрай, за да инжектирате булевирид. Извадете иглата от кожата. Отстранете иглата от спринцовката и изхвърлете и двете по подходящ начин, така че никой да не може да бъде наранен (вижте ЗГ).