



3A
Nadel in Durchstechflasche einführen

Nehmen Sie die Spritze zur Hand. Führen Sie die Nadel in die Durchstechflasche mit flüssigem Bulevirtid ein.




3B
Bulevirtid aufziehen

Drehen Sie die Durchstechflasche vorsichtig auf den Kopf. Achten Sie darauf, dass sich die Spitze der Nadel stets unter der Oberflächener Bulevirtid-Lösung befindet, um zu verhindern, dass Luftblasen in die Spritze eindringen. Ziehen Sie den Spritzenkölben langsam zurück, um 1,0 ml Bulevirtid aufzuziehen.



3C
Vorbereitung abschließen


Klöpfen öder schnippen Sie vorsichtig gegen die Spritze und drücken Sie den Kölben hinunter bzw. ziehen Sie ihn zurück, um überschüssige Luft und Blasen zu entfernen. Um sicherzustellen, dass sich letztlich 1,0 ml Bulevirtid in der Spritze befinden, müssen Sie unter Umständen den Spritzenkölben bis hinter die 1,0 ml-Markierung zurückziehen. Ziehen Sie die Spritze mit der Nadel vorsichtig aus der Durchstechflasche.



3D
Nadel wechseln und alte Nadel entsorgen

Entfernen Sie die längere Nadel von der Spritze und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß, sodass sich niemand verletzen kann.

Wichtig! Setzen Sie die Kunststoff-Schutzkappe nicht wieder auf die Nadel auf.



3E
Nadel für Injektion anbringen

Bringen Sie die kürzere Nadel an der Spritze an.

Wichtig! Stellen Sie sicher, dass die mit der Schutzkappe versehene Nadel fest sitzt, indem Sie sie leicht nach unten drücken und im Uhrzeigersinn drehen.


Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzkappe ab.



3F
Injektionsstelle wählen


Wählen Sie eine andere Injektionsstelle als die, die Sie bei der letzten Injektion verwendet haben. Reinigen Sie die Injektionsstelle mit einem frischen Alkohöltupfer. Beginnen Sie in der Mitte, üben Sie Druck aus und reinigen Sie mit einer kreisförmigen Bewegung von innen nach außen.

Wichtig! Lassen Sie die Injektionsstelle an der Luft trocknen.



3G
Injektionsstelle vorbereiten

Drücken Sie die Haut um die Injektionsstelle herum zu einer Hautfalte zusammen und halten Sie die Falte in dieser Position fest.



3H
Bulevirtid injizieren

Stechen Sie die Nadel in einem 45-Grad-Winkel in die Haut. Die Nadel muss fast ganz eingeführt werden. Drücken Sie den Spritzenkölben vollständig hinunter, um Bulevirtid zu injizieren.

Ziehen Sie die Nadel aus der Haut heraus.

Entfernen Sie die Nadel von der Spritze und entsorgen Sie Nadel und Spritze ordnungsgemäß, sodass sich niemand verletzen kann (siehe 3D).



Injektionsanleitung



NL-HPX-0031 April 2024

Gilead Sciences Netherlands B.V.
Claude Debussylaan 22
1082 MD Amsterdam

©2024 Gilead Sciences, Inc. All rights reserved. GILEAD, the GILEAD Logo and Creating Possible are trademarks of Gilead Sciences, Inc.

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung.

Schritt-für-Schritt-Injektionsanleitung


Bevor Sie Hepcludex anwenden, müssen Sie zuerst Abschnitt I bis 6 dieser Packungsbeilage lesen.

Bevor Sie die Behandlung mit diesem Arzneimittel zu Hause beginnen, wird Ihr Arzt oder das medizinische Fachpersonal Ihnen zeigen, wie Hepcludex vorzubereiten und zu injizieren ist. In dieser Anleitung wird gezeigt, wie Sie sich das Arzneimittel selbst injizieren. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder dem medizinischen Fachpersonal, wenn Ihnen etwas unklar ist, wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie weitere Informationen oder Hilfe benötigen. Nehmen Sie sich Zeit, um Hepcludex sorgfältig vorzubereiten und zu injizieren.



Injektionsstellen

Um Reaktionen an der Injektionsstelle zu reduzieren, können Sie die Stelle der Bulevirtid-Injektion regelmäßig wechseln. In folgende Bereiche darf Bulevirtid nicht injiziert werden: Knie, Leistenengegend, untere oder innere Gesäßbacken, direkt über einem Blutgefäß, im Bereich um den Bauchnabel herum, in Narbengewebe, in einen blauen Fleck, in einen Leberfleck, in eine operative Narbe, in ein Tattoo oder eine verbrannte Hautstelle oder überall dort, wo bereits eine Injektionsstellen-Reaktion vorliegt.

Bauch




Oberschenkel




1A Aufbewahrung

Bulevirtid-Durchstechflaschen müssen in der Originalverpackung im Kühlschrank (2 °C bis 8 °C) aufbewahrt werden, um Bulevirtid vor Licht zu schützen.




1B Dosen vorbereiten

Die folgenden Anweisungen gelten für das Auflösen einer Einzeldosis.




1C Hände waschen

Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Seife und warmem Wasser und trocknen Sie sie mit einem sauberen Handtuch ab. Sobald Ihre Hände sauber sind, berühren Sie keine anderen Gegenstände als das Arzneimittel, die Zubehörmaterialien und den Bereich um die Injektionsstelle herum.



1D Oberseite der Durchstechflasche reinigen

Wischen Sie die Oberseite der Durchstechflasche mit einem frischen Alkoholtupfer ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen. Wenn Sie die Oberseite des Gummistopfens nach der Reinigung berühren, reinigen Sie sie erneut mit einem frischen Alkoholtupfer.



2A Steriles Wasser aufziehen

Nehmen Sie die Spritze zur Hand. Bringen Sie die längere Nadel an.

Wichtig! Stellen Sie sicher, dass die mit der Schutzkappe versehene Nadel fest sitzt, indem Sie sie leicht nach unten drücken und im Uhrzeigersinn drehen.

Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzkappe ab.

Öffnen Sie das sterile Wasser für Injektionszwecke. Führen Sie die Nadel in die Durchstechflasche ein und drehen Sie die

Wasser-Durchstechflasche vorsichtig auf den Kopf. Achten Sie darauf, dass sich die Spitze der Nadel stets unter der Wasseroberfläche befindet, um zu verhindern, dass Luftblasen in die Spritze eindringen.

Wasser-Durchstechflasche vorsichtig auf den Kopf. Achten Sie darauf, dass sich die Spitze der Nadel stets unter der Wasseroberfläche befindet, um zu verhindern, dass Luftblasen in die Spritze eindringen.




2D Bulevirtid überprüfen

Sobald das Pulver beginnt sich aufzulösen, stellen Sie es einfach beiseite; es wird sich vollständig auflösen. Nach dem Schnippen gegen die Flasche kann das Auflösen bis zu 3 Minuten dauern.




2E Bulevirtid bereit für die Injektion

Nach dem vollständigen Durchmischen sollte die Bulevirtid-Lösung klar sein. **Wichtig!** Das vollständig aufgelöste Bulevirtid sollte klar sein und keinen Schaum aufweisen. Wenn die Bulevirtid-Lösung schaumig oder gelblich aussieht, warten Sie etwas länger, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat. Wenn Sie Blasen sehen, klopfen Sie vorsichtig gegen



2B Steriles Wasser in das Pulver injizieren

Klopfen Sie vorsichtig gegen die Bulevirtid-Durchstechflasche, um das Pulver aufzulockern. Führen Sie die Nadel der Spritze mit dem sterilen Wasser angewinkelt in die Bulevirtid-Durchstechflasche ein. Injizieren Sie das sterile Wasser langsam ein, sodass es an der Wand der Durchstechflasche in das Bulevirtid-Pulver heruntertropfen kann.



2C Bulevirtid vorsichtig mischen

Klopfen Sie 10 Sekunden lang vorsichtig gegen die Bulevirtid-Durchstechflasche, um die Auflösung des Pulvers in Gang zu setzen. Rollen Sie die Bulevirtid-Durchstechflasche anschließend langsam zwischen Ihren Händen, um sicherzustellen, dass der Inhalt gründlich durchgemischt wird. Vergewissern Sie sich, dass kein Bulevirtid-Pulver an der Wand der Durchstechflasche anhaftet.

Wichtig! Schütteln Sie die Bulevirtid-Durchstechflasche nicht. Wenn Sie sie schütteln, bildet das Arzneimittel Schaum und es dauert deutlich länger, bis das Arzneimittelaufgelöst ist.

2F Durchstechflasche reinigen

Reinigen Sie die Oberseite der Durchstechflasche erneut mit einem frischen Alkoholtupfer.

Lassen Sie sie an der Luft trocknen.

