




Instrucțiuni de injectare




NL-HPX-0038 April 2024

Gilead Sciences Netherlands B.V.
Claude Debussylaan 22
1082 MD Amsterdam

©2024 Gilead Sciences, Inc. All rights reserved. GILEAD, the GILEAD Logo and Creating Possible are trademarks of Gilead Sciences, Inc.

▼ Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare.



2A
Extrageți apă sterilă

Luați seringă. Puneți-i acul mai lung.

Important! Asigurați-vă că acul cu capac este bine fixat, împingându-l ușor în jos în timp ce îl rotiți în sensul acelor de ceasornic.

Scoateți capacul de plastic.

Deschideți flaconul cu apă sterilă pentru preparate injectabile. Introduceți acul în flacon și întoarceți ușor flaconul cu apă cu fundul în sus. Asigurați-vă că vârful acului rămâne permanent sub suprafața apei, ca să nu pătrundă bule de aer în seringă.

Trageți încet pistonul înapoi pentru a introduce 1,0 ml de apă sterilă în seringă. Scoateți cu grijă acul și seringă din flacon.




2B
Injectați apă sterilă în pulbere

Bateți ușor în flaconul cu bulevirtidă pentru a afâna pulberea.

Introduceți acul seringii cu apă sterilă, înclinat, în flaconul cu bulevirtidă.

Injectați încet apa sterilă, astfel încât să picure pe peretele flaconului și să intre în pulberea de bulevirtidă.



2C
Amestecați ușor bulevirtida

Bateți ușor flaconul cu bulevirtidă cu vârful degetului timp de 10 secunde pentru ca pulberea să înceapă să se dizolve. Apoi, frecați ușor flaconul cu bulevirtidă între palme pentru a asigura amestecarea completă. Asigurați-vă că nu rămâne pulbere de bulevirtidă prinsă pe peretele flaconului.

Important! Nu scuturați flaconul cu bulevirtidă. Scuturarea va determina medicamentul să facă spumă și dizolvarea va dura mult mai mult.



2D
Verificați bulevirtida

După ce pulbera începe să se dizolve, puneți flaconul deoparte și aceasta se va dizolva complet.
După ce tapotați cu degetele, dizolvarea poate dura până la 3 min.




2E
Pregătiți bulevirtida pentru injecție

După ce s-a amestecat complet, soluția de bulevirtidă trebuie să fie clară.
Important! Bulevirtida complet dizolvată trebuie să fie clară și să nu aibă spumă.
Dacă soluția de bulevirtidă prezintă spumă sau este gălbuie, lăsați-o mai mult timp să se dizolve.

Dacă vedeți bule de aer, tapotați ușor flaconul până când acestea dispar.
Dacă observați particule în soluția de bulevirtidă după ce aceasta s-a dizolvat (complet), nu folosiți flaconul respectiv.
Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului care vi l-a furnizat.


Bulevirtida reconstituită trebuie utilizată imediat.



2F
Curățați flaconul

Curățați din nou partea superioară a flaconului de bulevirtidă, folosind un tampon de alcool nou.


Lăsați-l să se usuce la aer



3A
Introduceți acul în flacon


Luăți seringă.

Introduceți acul în flaconul cu bulevirtidă lichidă.




3B
Extrageți bulevirtida

Întoarceți ușor flaconul cu fundul în sus. Asigurați-vă că vârful acului rămâne permanent sub suprafața soluției de bulevirtidă pentru a împiedica pătrunderea bulelor de aer în seringă. Trageți încet pistonul pentru a scoate 1,0 ml de bulevirtidă.




3C
Finalizați prepararea

Bateți ușor sau dați un bobârnac seringii și împingeți/trageți pistonul pentru a scoate aerul și bulele de aer. Pentru a vă asigura că în seringă rămân 1,0 ml de bulevirtidă, este posibil să trebuiască să trageți pistonul dincolo de marcajul de 1,0 ml. Scoateți cu grijă acul și seringă din flacon.



3D
Schimbați și aruncați acul

Scoateți acul mai lung din seringă și aruncați-l în mod corespunzător astfel încât să nu poată răni pe nimeni. **Important!** Nu puneți capacul de plastic înapoi pe ac.



3E
**Atașați acul pentru
injecție**

Introduceți acul mai
scurt în seringă.

Important! Asigurați-
vă că acul cu capac
este bine fixat,
împingându-l ușor în
jos în timp ce îl rotiți în
sensul acelor de
ceasornic.


Scoateți capacul de
plastic.



3F
**Alegeți locul de
injecție**


Alegeți un loc diferit
de cel pe care l-ați
folosit la ultima
injecție. Curățați locul
de injecție cu un
tampon nou cu alcool.
Începeți dinspre centru,
aplicați presiune și
curățați folosind o
mișcare circulară, către
exterior.

Important! Lăsați
locul să se usuce la aer.



3G
**Pregătiți locul de
injecție**

Prindeți cu două degete
și țineți un pliu de piele
din jurul locului de
injecție.



3H
Injecțați bulevirtida

Străpungeți pielea într-
un unghi de 45 de
grade. Acul trebuie
introdus aproape
complet.

Apăsați încet pistonul
până la capăt pentru a
injecța bulevirtida.
Scoateți acul din piele.
Scoateți acul din
seringă și îndepărtați-le
pe amândouă în mod
corespunzător, astfel
încât nimeni să nu
poată fi rănit (vezi 3D).