

Zie de Samenvatting van de productkenmerken van *axicabtagen-ciloleucel* of *brexucabtagene autoleucel*, inclusief de bijsluiter en het voorlichtingsmateriaal voor artsen, te verkrijgen door contact op te nemen met Kite, een Gilead company, Medical Information, via NLMed.Info@gilead.com.

De Europese groep voor bloed- en mergtransplantatie (European Group for Blood and Marrow Transplantation EBMT) houdt een register bij voor de follow-up van patiënten die *axicabtagen-ciloleucel* of *brexucabtagene autoleucel* hebben gekregen. Aanvullende informatie is verkrijgbaar via: registryhelpdesk@ebmt.org.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR ARTSEN

- Deze patiënt is behandeld met een product voor immunotherapie met gemodificeerde autologe T cellen dat kan leiden tot ernstige en zelfs fatale cytokine-release-syndroom en neurologische bijwerkingen. Het cytokine-release-syndroom kan zich in elk orgaan manifesteren.
- **WAARSCHUWING:** cytokine-release-syndroom en neurologische bijwerkingen. Zie de Samenvatting van de productkenmerken voor volledige informatie.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR ARTSEN (vervolg)

- Monitor de patiënt op tekenen en symptomen van cytokine-release-syndroom en neurologische bijwerkingen.
- Zie het voorlichtingsmateriaal voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg over de behandeling van cytokine-release-syndroom en neurologische bijwerkingen.
- **Neem onmiddellijk contact op met de arts van de patiënt voor meer informatie.**

YESCARTA[®]▼ (axicabtagen-ciloleucel)
Dispersie voor infusie

TECARTUS[®]▼ (brexucabtagene autoleucel)
Dispersie voor infusie

SOS-kaart

▼ Deze geneesmiddelen zijn onderworpen aan aanvullende monitoring.

Neem deze kaart mee als u naar het ziekenhuis of naar een andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, dan uw behandelaar gaat.

Vergeet niet om alle beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg met wie u een afspraak hebt, te zeggen dat u wordt behandeld met een immunotherapie met autologe T cellen en LAAT ZE DEZE KAART ZIEN.

CONTACTGEGEVENS VAN MIJN BEHANDELAAR EN DATUM VAN INFUSIE

Naam van de behandelaar:

Telefoonnummer werk:

Telefoon buiten kantooruren:

Naam en telefoonnummer patiënt:

Product toegediend:

Schrijf de naam op van het toegediende product

Product lotnummer:

Datum van infusie:

BELANGRIJKE HERINNERINGEN VOOR PATIËNTEN

- Als u last heeft van ernstige misselijkheid, braken, diarree, moeheid, koorts of andere nieuw optredende symptomen, met name één van de symptomen op deze kaart, informeer dan onmiddellijk uw arts, uw behandelaar of een andere beschikbare behandelaar.
- Neem na de behandeling 2 keer per dag uw temperatuur op gedurende 3 tot 4 weken. Als uw temperatuur verhoogd is, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.
- Behandel deze symptomen niet zelf met zelfzorggeneesmiddelen of kruidenmiddelen/voedingssupplementen zonder goedkeuring van uw behandelaar.

BELANGRIJKE HERINNERINGEN VOOR PATIËNTEN (vervolg)

Schrijf de naam op van het toegediende product

kan ernstige bijwerkingen in verschillende delen van uw lichaam veroorzaken. Deze symptomen kunnen levensbedreigend of zelfs fataal zijn, en moeten onmiddellijk worden behandeld.

Symptomen die mild lijken, kunnen snel verergeren.

Symptomen kunnen vertraagd optreden, soms weken na uw infusie.

Voel u niet bezwaard om contact op te nemen met uw behandelaar. U bent hem/haar niet tot last.

Bel onmiddellijk uw behandelaar als u een van deze symptomen heeft

Neurologische bijwerkingen

- verwardheid
- moeite met praten
- moeite met gesprekken begrijpen
- tremoren (trillende armen of lichaamsdelen)
- onrust
- slaperiger zijn
- duizeligheid

Cytokine-release-syndroom

- koorts (bijv. temperatuur hoger dan 38°C)
- vermoeidheid
- kortademigheid
- lage urineproductie
- misselijkheid
- braken
- diarree
- onregelmatige hartslag